


# KALKÜLÜS 2

## ÇALIŞMA KİTABI

10 ünite · 162 soru · adım adım çözümler



**Ertan Sinan Şahin**



[ertansinansahin.com](http://ertansinansahin.com)

# 5. ÜNİTE



video izle

## İNTEGRASYON UYGULAMALARI

|               |                                                           |                   |                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| dilimleme     | $V = \int_a^b A(x) dx$                                    | dönel yüzey alanı | $S = 2\pi \int (\text{yarıçap}) ds$                      |
| pul yöntemi   | $V = \pi \int_a^b (R^2 - r^2) dx$                         | iş                | $W = \int_a^b F(x) dx$                                   |
| kabuk yöntemi | $V = 2\pi \int_a^b (\text{yarıçap})(\text{yükseklik}) dx$ | kütle merkezi     | $\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M}$ |
| eğri uzunluğu | $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$                    | Pappus            | $V = 2\pi \rho A, \quad S = 2\pi \rho L$                 |

### Dilimleme: disk ve pul yöntemleri


5.1

★★★ Çözüm → s. 91

Bir cismin tabanı,  $xy$  düzleminde  $y = 4 - x^2$  parabolü ile  $x$  eksenini arasında kalan bölgedir. Cismin  $y$  eksenine dik her kesiti, tabanı bu bölgenin içinde kalan yatay bir doğru parçası olan bir şekildir. Kesitler

- kare ise,
- çapı bu doğru parçası olan yarım daire ise

cismin hacmini bulunuz.



5.2

★★★ Çözüm → s. 91


$y = \sec x$  eğrisi ile  $y = 1$  doğrusu arasında kalan ve  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$  aralığında bulunan bölge  $x$  eksenini etrafında döndürülüyor. Oluşan cismin hacmini bulunuz.

## 5.3

★★★ Çözüm → s. 91

Birinci bölgede  $y = x$  doğrusu ile  $y = x^3$  eğrisi arasında kalan bölge veriliyor.

- Bölge  $y = 1$  doğrusu etrafında döndürülüyor. Oluşan cismin hacmini bulunuz.
- Bölge  $y$  eksen etrafında döndürülüyor. Hacmi pul yöntemiyle bulunuz.



## Silindirik kabuklar

## 5.4

★★★ Çözüm → s. 91

$y = \frac{1}{\sqrt{25 - x^2}}$  eğrisi,  $x$  eksenini,  $y$  eksenini ve  $x = 3$  doğrusu arasında kalan bölge  $y$  eksenini etrafında döndürülüyor.

- Oluşan cismin hacmini kabuk yöntemiyle bulunuz.
- Aynı hacmi  $y$ 'ye göre disk ve pul yöntemleriyle hesaplayarak sonucu doğrulayınız. Bu yolun neden daha zahmetli olduğunu açıklayınız.

## 5.5

★★★ Çözüm → s. 92

$y = 1/x$  eğrisi,  $y = 1$  doğrusu ve  $x = 3$  doğrusu arasında kalan  $R$  bölgesi  $x = 4$  doğrusu etrafında döndürülüyor. Oluşan cismin hacmi aşağıdakilerden hangisidir?


**A)**  $2\pi \int_1^3 (x+4)\left(1-\frac{1}{x}\right) dx$

**B)**  $2\pi \int_1^3 \frac{4-x}{x} dx$

$$\text{C) } 2\pi \int_1^3 (4-x)\left(1-\frac{1}{x}\right) dx$$

$$\text{D)} \pi \int_{1/3}^1 \left[ 1 - \left( 4 - \frac{1}{y} \right)^2 \right] dy$$

**E)**  $\pi \int_1^3 \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2 dx$



# ÇÖZÜMLER

## 5 İNTEGRASYON UYGULAMALARI

### 5.1

← Soru s. 4

Kesitler  $y$  eksenine dik olduğundan  $y$ 'ye göre integral alınır.  $y$  yüksekliğindeki yatay doğru parçasının uçları  $4 - x^2 = y$  denkleminde  $x = \pm\sqrt{4-y}$ 'dir. Kesitin tabanının uzunluğu  $s(y) = 2\sqrt{4-y}$ ,  $0 \leq y \leq 4$ 'tür.

a. Kare kesitin alanı  $A(y) = s^2 = 4(4-y)$ 'dir:

$$V = \int_0^4 4(4-y) dy = 4 \left[ 4y - \frac{y^2}{2} \right]_0^4 = 32.$$

b. Yarım dairenin yarıçapı  $\frac{s}{2} = \sqrt{4-y}$ 'dir; alanı  $A(y) = \frac{\pi}{2}(4-y)$  olur:

$$V = \frac{\pi}{2} \int_0^4 (4-y) dy = \frac{\pi}{2} \cdot 8 = 4\pi.$$

**Kontrol:** Her yükseklikte yarım daire alanı kare alanının  $\frac{\pi}{8}$ 'idir; hacimler de aynı oranda olmalıdır:  $32 \cdot \frac{\pi}{8} = 4\pi$ .

**CEVAP** a. 32 b.  $4\pi$

### 5.2

← Soru s. 4

Bölge eksene değmez;  $x$  eksenine dik kesitler pul (ortası delik disk) biçimindedir.  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$  aralığında  $\sec x \geq 1$  olduğundan dış yarıçap  $R = \sec x$ , iç yarıçap  $r = 1$ 'dir:

$$V = \pi \int_0^{\pi/3} (\sec^2 x - 1) dx = \pi [\tan x - x]_0^{\pi/3} = \pi \left( \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right) \approx 2.15.$$

Sık yapılan hata, integrale  $(R-r)^2 = (\sec x - 1)^2$  yazmaktır. Pulun alanı  $\pi R^2 - \pi r^2$ 'dir,  $\pi(R-r)^2$  değil.

**CEVAP**  $\pi \left( \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right) \approx 2.15$

### 5.3

← Soru s. 5

$0 \leq x \leq 1$  aralığında  $x^3 \leq x$ 'tir; bölgenin üstünde doğru, altında eğri vardır.

a. Eksen  $y = 1$  bölgenin üstündedir.  $x$  noktasındaki dik kesit bir puldur. Eksene uzak olan sınır alttaki eğridir:  $R = 1 - x^3$ ,  $r = 1 - x$ .

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 [(1-x^3)^2 - (1-x)^2] dx \\ &= \pi \int_0^1 (2x - x^2 - 2x^3 + x^6) dx \\ &= \pi \left( 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{7} \right) = \frac{13\pi}{42}. \end{aligned}$$

b.  $y$  eksenine dik kesitler alınır; sınırlar  $x$ 'e göre yazılır.  $y$  yüksekliğinde bölge  $x = y$ 'den  $x = y^{1/3}$ 'e uzanır:  $R = y^{1/3}$ ,  $r = y$ .

$$V = \pi \int_0^1 (y^{2/3} - y^2) dy = \pi \left( \frac{3}{5} - \frac{1}{3} \right) = \frac{4\pi}{15}.$$

**Kontrol:** Kabuk yöntemiyle  $2\pi \int_0^1 x(x - x^3) dx = 2\pi \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{4\pi}{15}$ .

**CEVAP** a.  $\frac{13\pi}{42}$  b.  $\frac{4\pi}{15}$

### 5.4

← Soru s. 6

a. Eksene paralel (düşey) şeritler silindirik kabuk üretir: yarıçap  $x$ , yükseklik  $\frac{1}{\sqrt{25-x^2}}$ .

$$V = 2\pi \int_0^3 \frac{x dx}{\sqrt{25-x^2}}.$$

$u = 25 - x^2$ ,  $du = -2x dx$  dönüşümüyle sınırlar 25 ve 16 olur:

$$V = \pi \int_{16}^{25} u^{-1/2} du = \pi [2\sqrt{u}]_{16}^{25} = 2\pi(5-4) = 2\pi.$$

b. Eğri  $x = 0$ 'da  $y = \frac{1}{5}$ 'den  $x = 3$ 'te  $y = \frac{1}{4}$ 'e yükselir. Yatay dilimler iki türdür:

- $0 \leq y \leq \frac{1}{5}$ : dilim  $y$  ekseninden  $x = 3$ 'e kadar uzanır; disk yarıçapı 3'tür.
- $\frac{1}{5} \leq y \leq \frac{1}{4}$ : dilim eğriden  $x = 3$ 'e uzanır; pulun

iç yarıçapı için  $x^2 = 25 - \frac{1}{y^2}$ .

$$\begin{aligned} V &= \pi \cdot 9 \cdot \frac{1}{5} + \pi \int_{1/5}^{1/4} \left(9 - 25 + \frac{1}{y^2}\right) dy \\ &= \frac{9\pi}{5} + \pi \left[ -16y - \frac{1}{y} \right]_{1/5}^{1/4} \\ &= \frac{9\pi}{5} + \pi \left( -8 + \frac{41}{5} \right) = \frac{9\pi}{5} + \frac{\pi}{5} = 2\pi. \end{aligned}$$

Bu yolda eğriyi  $x = g(y)$  biçiminde yazmak, bölgeyi ikiye bölmek ve ikinci parçada pul kullanmak gerekir. Kabuk yönteminde ise tek integral yeter.

**CEVAP** a.  $2\pi$  b.  $2\pi$  (iki parçalı integral)

### 5.5

← Soru s. 6

$1 \leq x \leq 3$  aralığında  $\frac{1}{x} \leq 1$ 'dir; bölgenin üstünde doğru, altında eğri vardır. Eksen düşey olduğundan düşey şeritler kabuk üretir.  $x$ 'teki şeridin yüksekliği  $1 - \frac{1}{x}$ , eksene uzaklığı  $4 - x$ 'tir (eksen bölgenin sağındadır):

$$V = 2\pi \int_1^3 (4-x) \left(1 - \frac{1}{x}\right) dx.$$

- (A) yarıçapı  $x + 4$  alır; bu,  $x = -4$  eksenini içindir.
- (B) yüksekliği  $\frac{1}{x}$  alır; bu, eğrinin altında kalan bölgeyi döndürür.
- (D) pul yöntemidir ama yarıçaplar yer değiştirmiştir.  $y$  yüksekliğinde  $R$  bölgesi  $x = \frac{1}{y}$ 'den  $x = 3$ 'e uzanır. Eksene uzak yarıçap  $R = 4 - \frac{1}{y}$ , yakın yarıçap  $r = 4 - 3 = 1$ 'dir. (D)'nin integrandı negatiftir.
- (E)  $y = 1$  doğrusu etrafındaki disk hacmidir.

(C)'deki integrali hesaplayalım:

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_1^3 \left(5 - x - \frac{4}{x}\right) dx \\ &= 2\pi (10 - 4 - 4 \ln 3) = 4\pi (3 - 2 \ln 3) \approx 10.09. \end{aligned}$$

**Kontrol:** Doğru pul integrali aynı değeri verir:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{1/3}^1 \left[ \left(4 - \frac{1}{y}\right)^2 - 1 \right] dy \\ &= \pi \int_{1/3}^1 \left(15 - \frac{8}{y} + \frac{1}{y^2}\right) dy \\ &= \pi (10 - 8 \ln 3 + 2) = 4\pi (3 - 2 \ln 3). \end{aligned}$$

**CEVAP** C

### 5.6

← Soru s. 7

Düşey eksenlerde kabuk, yatay eksen de disk yöntemi tek integralle sonuç verir.

a. Yarıçap  $x$ , yükseklik  $\frac{8}{x^3}$ :

$$V = 2\pi \int_1^2 x \cdot \frac{8}{x^3} dx = 16\pi \left[ -\frac{1}{x} \right]_1^2 = 8\pi.$$

b. Yarıçap  $x + 1$ :

$$\begin{aligned} V &= 16\pi \int_1^2 \left( \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) dx \\ &= 16\pi \left( \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \right) = 14\pi. \end{aligned}$$

**Kontrol:** Eksen 1 birim uzaklaşınca her kabuğun yarıçapı 1 artar; hacim  $2\pi \cdot 1 \cdot A$  kadar büyür. Bölgenin alanı  $A = \int_1^2 8x^{-3} dx = 3$ 'tür ve  $14\pi - 8\pi = 6\pi = 2\pi \cdot 3$ .

c. Diskin yarıçapı  $\frac{8}{x^3}$ 'tür:

$$V = \pi \int_1^2 \frac{64}{x^6} dx = \frac{64\pi}{5} \left( 1 - \frac{1}{32} \right) = \frac{62\pi}{5}.$$

**CEVAP** a.  $8\pi$  b.  $14\pi$  c.  $\frac{62\pi}{5}$

### 5.7

← Soru s. 8

Kalkülüsün Temel Teoremi'ne göre  $y' = \sqrt{x^2 + 4x + 3}$ 'tür ( $x \geq 0$  için kökün içi pozitifdir). Buna göre

$$1 + (y')^2 = x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$$

olur.  $x + 2 > 0$  olduğundan kök  $x + 2$ 'dir:

$$L = \int_0^2 (x + 2) dx = \left[ \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^2 = 6.$$

Eğrinin formülünü bilmek gerekmedi; eğri uzunluğu yalnız türeve bağlıdır.

**CEVAP** 6

### 5.8

← Soru s. 8

a. Türev  $y' = \frac{1}{2}(x^{1/4} - x^{-1/4})$ 'tür. Karesini alalım:

$$\begin{aligned} 1 + (y')^2 &= 1 + \frac{1}{4}(x^{1/2} - 2 + x^{-1/2}) \\ &= \frac{1}{4}(x^{1/2} + 2 + x^{-1/2}) \\ &= \left[ \frac{1}{2}(x^{1/4} + x^{-1/4}) \right]^2. \end{aligned}$$

Ortadaki  $-2$ ,  $+2$ 'ye dönüştü; tam kare buradan gelir.